



Pratiques optimales de l'AVC au Canada

RECOMMANDATIONS CANADIENNES POUR LES PRATIQUES OPTIMALES DE SOINS DE L'AVC

Thrombose veineuse cérébrale

Septième édition, 2024

Tableau 1 : Manifestations cliniques fréquentes lors de la survenue d'une thrombose veineuse cérébrale

*Field T.S, Mandzia J (Présidents du groupe de rédaction)
au nom du groupe de rédaction du module sur la thrombose veineuse cérébrale
des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de
l'AVC, en collaboration avec le Consortium Neurovasculaire Canadien.*

© Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 2024.

TABLEAU 1 : Manifestations cliniques fréquentes lors de la survenue d'une thrombose veineuse cérébrale[^]

Symptôme prédominant	Prévalence (%)
Céphalées	87 à 89 %
Convulsions	24 à 40 %
Déficits neurologiques focaux	18 à 48 %
Altération de l'état de conscience ou encéphalopathie	18 à 22 %
Perte de la vision	13 à 27 %
Diplopie ou autres neuropathies crâniennes	11 à 14 %

[^] Ce tableau résume les symptômes les plus courants présentés par les participants aux deux plus grandes études prospectives publiées relatives à la TVC symptomatique, mais ne constitue pas une liste exhaustive de tous les symptômes potentiels (Silvis et coll., 2017) (Ferro et coll., 2004) (Duman et coll., 2017).